

הנחיות לאיסוף דגימות צואה לתרבית ו/או לבדיקת טפילים/ קלוסטרידיום

1. יש להמתין לפחות שלוש יממות (72 שעות) אחרי שימוש בחומרים משלשלים או חומרים מונעי-שלשול.
2. לאחר שימוש בבריום (Barium) רצוי להמתין כשבוע.
3. בדיקת תרבית ורגישות יש לבצע לפני נטילת אנטיביוטיקה.
4. יש לדווח למעבדה במקרה של שימוש באנטיביוטיקה בשלושת הימים שלפני הבדיקה.
5. עדיף להשתמש בכלי המסופק ע"י המעבדה (צנצנת פלסטיק עם מכסה מתברג), אך ניתן להשתמש בכלי אחר בתנאי שיהיה נקי מעקבות סבון ומים, עם מכסה מתברג, וסגור היטב.
6. אין להביא צואה בחיתול (הדגימה מתקלקלת). ניתן לאסוף את הדגימה בעזרת כפית (או מקלון) חד פעמי לכלי האיסוף למעבדה.
7. כמות הצואה המספיקה לבדיקה: בערך כף (אין צורך בכמות גדולה).
8. אם הדגימה מכילה שתן או נוזלים אחרים שאינם חלק מהצואה (מים למשל) אמינות התוצאה עלולה להפגע.
9. **יש למסור מיד את דגימת הצואה למעבדה.** (מיקרואורגניזמים רגישים עלולים לא לשרוד זמן רב).

Instructions and recommendations for submitting samples for stool culture and for ova and parasites/Clostridium

1. Wait at least 72 hours after usage of laxatives or preventive diarrhea drugs.
2. Wait at least a week after undergoing tests that use Barium.
3. It is preferable to submit specimen during acute stage of infection.
4. It is preferable to perform the test before starting treatment with antibiotics.
5. Please inform the laboratory in case that antibiotic treatment had been started during the 3 days before the test.
6. It is preferable to use a sterile vessel supplied by the laboratory, (a plastic container with a screw-on cap). Any different vessel may be used, on condition that it is clean, free of soap and water, and tightly closed.
7. No sample in a diaper will be accepted.
8. A "spoonful" of sample should be sufficient for the analysis
9. A sample contaminated by urine, tap water or other liquids that are not part of the stool may cause erroneous results
10. **Sample must be sent immediately to the laboratory.** (Some extremely fragile microorganisms may no longer be available if sample transport is delayed)

תאריך 20.3.2012	חתימה אסף ענתי	שם ושלר ענת	הנחיות לאיסוף דגימות צואה לתרבית ו/או לבדיקת טפילים/ קלוסטרידיום	
עמוד מס. 1 מתוך 1			גרסה מס. 4	GL-3005-A1